

Mikro Zn

kapalné hnojivo s obsahem Zn
vázaného ve formě EDTA chelátu.

Výrobce: **HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, 530 02 Pardubice**

číslo typu: 16.5

číslo rozhodnutí o registraci: **1887**

Chemické a fyzikální vlastnosti:

vlastnost	hodnota
zinek jako Zn v %	min 3,0

Obsah rizikových prvků

splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50.

Rozsah a způsob použití:

Aplikuje se postřikem jako doplňková výživa v uvedených dávkách a termínech.

Doporučené dávkování hnojiva:

plodina	dávkování hnojiva l/ha	termín aplikace
Jarní a ozimé obiloviny	3 – 5 litrů při latentním nedostatku Zn	od konce odnožování do sloupkování
Kukuřice		od 2. do 11. listu
Řepka		od fáze listové růžice do konce prodlužování růstu
Cukrovka	5 – 8 litrů při viditelném nedostatku Zn	od fáze 4 listů do zapojení řádků
Okopaniny		od vzejtí do zapojení řádků
Luskoviny		před setím až do fáze butonizace
Chmel		ve fázi intenzivního růstu
Vinná réva	16 – 25 litrů při limitním nedostatku Zn	ve fázi intenzivního růstu
Ovocné dřeviny		ve fázi intenzivního růstu

Odměřené množství hnojiva nalijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte vodou na požadovaný objem. Aplikační dávka postřiku 200 až 400 l postřiku / ha. Hnojivo může být aplikováno v tank-mix kombinaci s většinou přípravků na ochranu rostlin, jestliže to výrobce nezakazuje. Aplikace v kombinaci s hnojivy typu DAM je možná, avšak z hlediska účinnosti listového hnojiva ji nedoporučujeme.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví práci

Výrobek není klasifikován dle Zákona 157/1998 Sb. a Nařízení vlády 25/1999 ve znění pozdějších předpisů jako nebezpečná látka či přípravek, přesto může však ohrozit zdraví při náhodném požití a při dlouhodobém styku s pokožkou, nadýchání se mlhy výrobku. Může dráždit sliznice a pokožku, při delším styku může způsobit i jejich poškození. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím studené vody s mýdlem. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Projeví-li se zdravotní obtíže nebo v případě pochybností o zdravotním stavu vyhledejte lékařskou pomoc, poskytněte lékaři etiketu či obal od výrobku, nebo bezpečnostní list.

Ve všech těžších případech, ale vždy při požití a zasažení očí vyhledejte resp. přivolejte lékařskou pomoc.

Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat postiženého ve stabilizované poloze.

Podmínky skladování:

Výrobek skladujte v uzavřených originálních obalech na suchém před povětrnostními vlivy (zejm. mrazem) chráněném místě. Výrobek skladujte odděleně od potravin, krmiv, léčiv, pesticidů a hořavin. Skladujte mimo dosah dětí a nepoučených osob. Při dodržení všech podmínek skladování a při skladování výrobku v uzavřených původních obalech je doba použitelnosti výrobku 24 měsíců od data výroby.

Způsoby zneškodňování látky / přípravku:

Případné zbytky výrobku nevylévejte do kanalizace a vodotečí, půdy. Zředte je vodou v poměru min. 1 + 10 dílů vody, pak je nalijte v poměru ca 1:1 do cca 10 % vápenného mléka, směs pak vlijte do min. 50 cm hluboké jámy v zemi.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Prázdný obal nespalujte, po vypláchnutí vodou jej předejte do organizovaného sběru k recyklaci.

Hnojivo se dodává balené.

Datum výroby:

Objem náplně: